

ARRETS EN BAISSSE ET « RECHUTES » EN HAUSSE : LE NOMBRE DE FUMEURS AUGMENTE A NOUVEAU !

Bruxelles, 1 mars 2010. Le nombre de fumeurs a encore augmenté en 2009, pour atteindre 32% de fumeurs quotidiens. C'est la deuxième augmentation consécutive, après une stabilisation observée de 2002 à 2007. Moins de fumeurs arrêtent et plus d'anciens fumeurs reprennent leur consommation. L'absence d'augmentation des taxes sur les produits du tabac et le report de l'interdiction totale de fumer dans l'horeca peuvent en être la raison.

Il apparaît, sur base d'une enquête menée auprès de 3 806 personnes de plus de 15 ans, que le pourcentage de fumeurs quotidiens atteint 32% en Belgique. A ce chiffre s'ajoutent 3% de fumeurs occasionnels. L'enquête a été effectuée par IPSOS, à la demande de la Fondation contre le Cancer et avec le soutien financier du Fonds Tabac.

La proportion de fumeurs quotidiens est passée de 27% en 2007 à 30% en 2008 et 32 % en 2009. C'est chez les hommes que l'augmentation est la plus marquée. De plus en plus de personnes recommencent à fumer et, parallèlement, de moins en moins décident d'arrêter. La proportion de jeunes fumeurs (15 - 24 ans) reste inchangée.

L'augmentation du nombre de fumeurs est probablement liée à l'absence d'augmentation des taxes sur les produits du tabac, ainsi qu'au report de l'interdiction totale de fumer dans l'horeca. La Fondation contre le Cancer en appelle aux autorités pour que ces mesures soient rapidement mises en place. 65% des personnes interrogées considèrent d'ailleurs que cette interdiction est justifiée.

Les conséquences de la crise économique sur les habitudes de consommation ne sont pas évidentes. A l'évidence, la crise économique n'a pas fait chuter la consommation de tabac en Belgique, contrairement à ce qui a, par exemple, été constaté en Islande, le pays qui a le plus souffert de la crise. L'Islande a ainsi vu sa proportion de fumeurs quotidiens baisser de 19% en 2007 à 15% en 2009.

Pipe à eau

L'enquête fait également apparaître que, sur l'ensemble des fumeurs interrogés, seul 1% utilise la pipe à eau (shisha). Mais, chez les jeunes fumeurs de 15 - 17 ans, ce pourcentage est de 6%.

14% des sondés pensent que la pipe à eau est moins nuisible pour la santé que la cigarette. Ce sont surtout les jeunes de 15 à 17 ans qui sous-estiment les dangers de la pipe à eau. 30% pensent en effet que la pipe à eau est le mode de consommation du tabac le moins dangereux.

Pourtant, tous les produits du tabac présentent la même dangerosité, due au processus de combustion. La moitié des fumeurs meurt prématurément du fait de leur consommation de tabac, qu'il s'agisse de tabac à rouler, de cigarettes à filtres, de cigarettes "light", de joints ou de pipe à eau. Différentes études montrent que fumer avec une pipe à eau n'empêche pas l'absorption de nicotine et d'autres substances nocives provenant du tabac.

.../...



COMMUNIQUE DE PRESSE

Fondation contre le Cancer
Chaussée de Louvain 479
1030 Bruxelles
02/743 45 75 (communication)

La Fondation contre le Cancer a pour objectif de rendre possible un maximum de progrès contre la maladie. Elle est active sur le plan national. Le cancer touche chaque année plus de 60 000 personnes.

C'est pourquoi la Fondation soutient financièrement la recherche cancérologique en Belgique. Elle fournit également aide sociale, soutien et information aux patients et à leurs proches. La Fondation encourage finalement la promotion de modes de vie sains, de la prévention et du dépistage.

Les moyens dont dispose la Fondation proviennent principalement des dons et des legs effectués par le public. En 2008, les recettes totales s'élèvent à 19,3 millions d'euros. De ce montant, 5 millions d'euros ont été attribués au soutien de la recherche, 4 millions d'euros à l'aide psycho-sociale ou matérielle aux patients et 4,2 millions d'euros pour la réalisation de projets d'information et de promotion à la santé.

www.cancer.be - Cancerphone 0800 15 801 - Ligne Tabac-Stop 0800 111 00 - www.tabacstop.be

Fin du communiqué de presse

Infos destinées aux journalistes – Pas pour publication

Si vous souhaitez obtenir plus d'information concernant l'enquête 'tabac' de la Fondation contre le Cancer, contactez :

Luk Joossens, tél. 02 743 37 06, GSM 0486 88 91 22, ljossens@cancer.be

ANNEXES

à l'enquête de la Fondation contre le Cancer sur le comportement des fumeurs - 2009

1. Méthodologie

- Sept enquêtes effectuées par Ipsos à la demande du CRIOC (2002), du VIG (2003) et de la Fondation contre le Cancer (2005, 2006, 2007, 2008, 2009), sur base de la même méthodologie, auprès de 2 000 personnes en 2002, 2003 et 2005 ; et auprès de 4 000 personnes en 2006, 2007, 2008 et 2009.
- La marge d'erreur pour l'échantillon de 4 000 personnes est de 1,3%. Il existe une différence significative dans le pourcentage de fumeurs quotidiens entre 2007 et 2008, et entre 2008 et 2009.
- 3 806 personnes de 15 ans et plus ont été interrogées 'face to face' à leur domicile du 4 septembre au 11 décembre 2009.
- L'échantillon a été stratifié en fonction des provinces et du type d'urbanisation. Le croisement de ces deux variables donne 37 cellules. Dans chacune de ces cellules, un point de départ a été sélectionné au hasard et s'est vu attribuer un certain nombre d'interviews, proportionnellement à la population de cette cellule. Le nombre de points de départ est estimé à cent.
- Des quotas ont été appliqués en ce qui concerne le sexe, l'âge, la profession (actif, inactif) et le niveau d'étude des personnes interrogées.
- La détermination des groupes sociaux s'appuie sur un ratio calculé d'après la profession du principal responsable des revenus du ménage et son niveau de formation. La population est classée en fonction de la valeur résultant de la combinaison de ces deux variables, puis répartie en huit groupes plus ou moins égaux. Le groupe qui correspond aux valeurs les plus élevées (et par conséquent au niveau professionnel et/ou de formation le plus élevé) est désigné comme le groupe 1, tandis que le groupe 8 concorde avec les valeurs les plus faibles.
- La population totale concernait 8 600 000 personnes de quinze ans et plus vivant en Belgique.

2. Le pourcentage de fumeurs augmente pour la première fois depuis 2002

D'après une enquête réalisée auprès de 3 806 personnes de plus de 15 ans (effectuée entre le 4 septembre et le 11 décembre 2009 par Ipsos pour la Fondation contre le Cancer et financée par le fonds 'tabac'), le pourcentage de fumeurs quotidiens en Belgique est de 32%. C'est la deuxième fois en 7 ans que le pourcentage de fumeurs quotidiens augmente de manière significative : 29% en 2002, 28% en 2003, 29% en 2005 et 2006, 27% en 2007, 30% en 2008 et 32% et 2009.¹

Tableau 1

Pourcentage de fumeurs quotidiens en Belgique (15 ans et plus)			
année	hommes	femmes	total
2002	33%	25%	29%
2003	32%	22%	28%
2005	35%	24%	29%
2006	33%	25%	29%
2007	31%	24%	27%
2008	34%	26%	30%
2009	37%	27%	32%

Source: CRIOC (2002), VIG (2003), Fondation contre le Cancer (2005-2006-2007-2009)

En 2009, notre pays comptait environ 4 040 000 personnes n'ayant jamais fumé, 3 010 000 fumeurs et 1 550 000 anciens fumeurs. Pour cette même année, on comptait 32% de fumeurs quotidiens, 3% de fumeurs occasionnels, 18% d'anciens fumeurs et 47 % de personnes n'ayant jamais fumé.

¹ Sept enquêtes effectuées par Ipsos sur base de la même méthodologie, à la demande du CRIOC (2002), du VIG (2003) et de la Fondation contre le Cancer (2005, 2006, 2007, 2008, 2009), sur base de 2 000 personnes en 2002, 2003 et 2005 ; et 4 000 personnes en 2006, 2007, 2008 et 2009.

Les fumeurs fument en moyenne 18 cigarettes par jour (même nombre qu'en 2008). Le pourcentage de fumeurs consommant du tabac à rouler a évolué comme suit : 27% en 2003-2004, 30% en 2006, 25% en 2007, 23% en 2008 et 24% en 2009. Le pourcentage de fumeurs fumant des cigarettes ordinaires s'élevait à 77% en 2003-2004, 65% en 2006, 78% en 2007, 79% en 2008 et 81% en 2009. En 2009, 81% des fumeurs ont fumé des cigarettes ordinaires, 24% du tabac à rouler, 6% des cigares, des cigarillos ou la pipe et 1% la pipe à eau ou shisha. Le total dépasse les 100% car certains fumeurs combinent différents types de consommation.

L'augmentation du nombre de fumeurs n'est pas due au hasard. L'expérience des 30 dernières années nous a montré que, sans nouveaux incitants, le nombre de fumeurs remonte toujours. Le prix d'un paquet de cigarettes a augmenté de 0,50 euro en 2007, ce qui a causé une baisse du pourcentage des fumeurs de 29% à 27%. Ces 3 dernières années, le prix des paquets des marques les plus vendues n'a augmenté que de 0,10 euro par an, et le nombre de fumeurs est passé de 27% à 32%. De plus, la part de marché des cigarettes à bas prix (4 euros ou moins le paquet) a presque atteint les 30%

Tableau 2

Evolution du prix (en euro) d'un paquet de 20 cigarettes (Marlboro) durant la période 2002 - 2010	
2002	3,20
2003	3,50
2004	3,85
2005	4,00
2006	4,00
2007	4,53*
2008	4,63**
2009	4,74***
2010	4,84****

* €4,30 pour un paquet de 19 cigarettes ** €4,40 pour un paquet de 19 cigarettes

*** €4,50 pour un paquet de 19 cigarettes **** €4,60 pour un paquet de 19 cigarettes

De plus, l'interdiction totale de fumer dans les cafés en Belgique a une fois de plus été mise sur une voie de garage. Pour rappel, 16 pays européens ont un horeca sans fumée à l'heure actuelle (Irlande, Norvège, Italie, Malte, Suède, Ecosse, Lituanie, Islande, Estonie, Angleterre, France, Slovénie, Pays-Bas, Finlande, Turquie et Chypre).

Les ventes de cigarettes ont chuté durant la période 2007-2009, de 7% en Belgique et de 18% au Grand-Duché du Luxembourg. Cette baisse est la conséquence d'un ralentissement des achats par les Britanniques ayant perdu du pouvoir d'achat à cause de la chute de la livre sterling face à l'euro, ce qui entraîne, pour eux, une hausse du prix des paquets en euro.

Les conséquences de la crise économique sur les habitudes de consommation des fumeurs ne sont pas très claires. En Islande, pays européen le plus touché par la crise économique, le pourcentage de fumeurs quotidiens est passé de 19% en 2007 à 15% en 2009. Notre analyse est que la crise économique n'a pas d'influence sur le démarrage de la consommation de tabac et peut compliquer l'arrêt tabagique. En comparaison avec 2007, on constate une augmentation du pourcentage de fumeurs masculins et une stagnation du pourcentage de personnes qui recommencent à fumer ou qui n'arrêtent pas. Le pourcentage de jeunes fumeurs (15 à 24 ans) reste inchangé.

3. Comparaison du nombre de fumeurs quotidiens selon la classe d'âge et le sexe en 2007, 2008 et 2009

L'échantillon de l'enquête effectuée par Ipsos à la demande de la Fondation contre le Cancer est composé d'environ 4 000 personnes de 15 ans et plus. C'est un large échantillon, qui permet une comparaison sur plusieurs années des habitudes de consommation en fonction des classes d'âge et du sexe. En comparaison avec 2007, on constate une augmentation du pourcentage de fumeurs chez les hommes. La reprise de la consommation de tabac augmente également, alors que le nombre d'arrêts baisse. Le pourcentage de jeunes fumeurs (15 à 24 ans) reste inchangé.

Tableau 3

Fumeurs quotidiens en fonction de l'âge et du sexe entre 2007 et 2009					
	15-24 ans	25-44 ans	45-64 ans	65 ans +	Total
Femmes 2007	24%	28%	28%	10%	24%
Femmes 2008	19%	36%	32%	8%	26%
Femmes 2009	19%	36%	34%	9%	27%
Hommes 2007	27%	37%	35%	15%	31%
Hommes 2008	30%	44%	34%	20%	34%
Hommes 2009	30%	44%	39%	25%	37%
Total 2007	26%	33%	32%	12%	27%
Total 2008	24%	40%	33%	13%	30%
Total 2009	26%	39%	36%	16%	32%

4. Comparaison du nombre de fumeurs quotidiens en 2007, 2008 et 2009 en fonction de la classe sociale et du sexe

La stratification en classes sociales est réalisée en fonction de l'occupation professionnelle et du niveau d'étude du principal responsable des revenus du ménage. La classe 1-2 est la plus élevée, et la 7-8 la plus basse. Par rapport à 2007, le pourcentage d'hommes fumeurs appartenant à la classe 7-8 est passé de 36% en 2007 à 45% en 2009. Pour les femmes, l'augmentation est répartie sur toutes les classes sociales.

Tableau 4

Habitues de consommation chez les hommes en 2007, 2008 et 2009 en fonction de la classe sociale					
Fumeurs quotidiens	Classe sociale 1-2	Classe sociale 3-4	Classe sociale 5-6	Classe sociale 7-8	Total
2007	25%	31%	31%	36%	31%
2008	27%	34%	38%	36%	34%
2009	28%	36%	37%	45%	37%

Tableau 5

Habitues de consommation chez les femmes en 2007, 2008 et 2009 en fonction de la classe sociale					
Fumeuses quotidiennes	Classe sociale 1-2	Classe sociale 3-4	Classe sociale 5-6	Classe sociale 7-8	Total
2007	19%	23%	28%	23%	24%
2008	19%	26%	31%	31%	26%
2009	22%	28%	33%	27%	27%

5. Proportion de fumeurs quotidiens par région

En 2009, on comptait 30% de fumeurs quotidiens en Flandres et 34% à Bruxelles et en Wallonie. En 2008, les chiffres étaient de 29% en Flandres et à Bruxelles et 32% en Wallonie.

6. Résultats concernant la pipe à eau

C'est la première fois que nous posons une question concernant l'usage de la pipe à eau (shisha) : 1% des fumeurs l'utilisent. C'est dans la catégorie d'âge des 15/17 ans qu'elle est le plus utilisée, avec 6% de consommateurs. A la question "Lequel de ces 5 produits du tabac est le moins dangereux pour la santé ?", 56% ont donné la bonne réponse, à savoir "aucun". 14% ont répondu la pipe à eau, 14% le cigare, 6% la cigarette, 6% le cannabis et 4% le tabac à rouler. Une fois de plus, la plupart des jeunes de 15 à 17 ans sous-estiment la dangerosité de la pipe à eau. 30% considère en effet que c'est la manière la moins dangereuse de fumer.